

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP-8-7-68 811379

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 Francs

N° 94 Juillet 1968/22

MOUCHE DES FRUITS

Les premières captures (2 insectes) de la circonscription ont été relevées au Boulou (Pyrénées-Orientales) le 26 Juin. Par ailleurs, le 3 Juillet une capture est enregistrée à Montpellier. Les fruits (abricots, pêches, poires) risquent donc désormais d'être contaminés. Il convient d'assurer leur protection; utiliser :

Délai d'emploi
avant récolte

o	x	D D T	15 jours
o		Diethyldiphenyldichlorethane	7 "
o		Dimethoate	7 "
*	o	Fenthion	15 "
		Formothion	7 "
o		Malathion	7 "
o		Methoxychlore	7 "
*		Trichlorfon	7 "

Les produits signalés de x sont efficaces contre la Tordeuse orientale
o " le Carpocapse
* " la Zeuzère

TORDEUSE ORIENTALE

Commencer la protection des fruits (pêches et poires) devant être récoltés entre le 1er et le 15 Août.

OLIVIER

Le nouveau vol de teigne a débuté. Exécuter un traitement.

TROUILLON

Pommier

Les premiers dégâts provoqués par les jeunes chenilles de Zeuzère sont apparents sur les pommiers (dessèchement de jeunes pousses et de feuilles). Ces attaques datent du 3 Juillet dans les vergers du littoral. Il convient donc de prévoir un traitement dans les jours à venir.

Nous donnons ci-après la liste des produits dont l'efficacité a été prouvée lorsqu'ils sont employés après la pénétration des chenilles, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous :

Cadence d'utilisation	Nom commun	Dose en grammes par hl
jusqu'à 28 jours	Mévinphos	50
14 "	Azinphos éthylé émulsion	40
14 "	Diéthion émulsion	100
14 "	Fenthion émulsion	75
14 "	Diazinon émulsion	60
14 "	Phosalone	60
7 "	Parathion éthylé	35
7 "	Parathion méthylé	40
7 "	Diazinon	40
7 "	Thrichlorfon	120

Le vol de sésie est très important. Dans les vergers contaminés, on devra tenir compte de ce que des éclosions massives se produiront dans 8 jours pour combiner le traitement zeuzère-sésie.

Dans tous les cas, il faut s'assurer de ^{la} bonne répartition du pesticide.

Dans bien des vergers les acariens (araignée rouge et araignée jaune) ont un regain d'activité.

L'application d'un acaricide spécifique et ovicide d'été est recommandée.

Le Binapacryl est très efficace contre l'araignée jaune. En 1967, utilisé dans certaines conditions (doses oïdium, temps calme et chaud) il a donné des résultats contre l'araignée rouge. L'Oxythioquinox (Morestan) a donné de même de bons résultats contre ce ravageur.

Poirier

Un traitement "zeuzère" doit être appliqué dans les mêmes conditions que celles indiquées pour le pommier.

Appliquer un pesticide en respectant les délais d'emploi.

Les produits inscrits dans le tableau ont une action contre les psylles.

BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

P. BERVILLE

Tirage du 4 Juillet 1968

Ministère de l'Agriculture

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure Agronomique de
MONTPELLIER

MONTPELLIER, le 5 Juillet 1968

N O T E : 10

Le deuxième vol de papillons d'eudémis est actuellement important à MONTPELLIER-GRAMMONT plus faible à SERVIAN (Hérault), ainsi qu'à TOULOUGES-CANOES (Pyrénées-Orientales); enfin son intensité est assez grande à GINESTAS et à DOUZENS (Aude).

Le traitement préventif qui s'y rapporte (D.D.T.) est à appliquer dès le 6 Juillet; on n'aura recours aux esters phosphoriques que lors de l'apparition des premiers dégâts.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles

G. BERNON

P 315